



VETERINARSKA AMBULANTA VETERINAR
ULICA, 11000 BEOGRAD
MOB: +381 64 6804-119
TEL: +381 1 111-111
E-MAIL: VETERINAR@VETERINAR.COM
WWW.VETERINAR.COM
PIB 111111111
BANKA 111-111111111-11

UPUTSTVO ZA NEGU ŽIVOTINJE NAKON CARSKOOG REZA

PODACI O VLASNIKU		25731
Ime i prezime	Popović Tihomir	
Adresa	Kralja Petra I 10 Grancarevo	
Kontakt telefon	064/6804-119 033/32-54-22	

PODACI O PACIJENTU						Karton 37673
Ime životinje	Beki	Pol	Ž	Starost	5 god. i 3 m.	
Vrsta	Pas	Rasa	Lagoto romanjolo ***			
Mikročip	68804578945613	Pasoš	456123			

Sta mozete ocekivati tokom postoperativnog perioda?

Kuja ce dobiti anestetik koji se elimise iz organizma dovoljno brzo da obicno polako dolazi sebi vec po zavrsetku operacije. Kompletan oporavak od anestetika moze trajati nekoliko sati, u zavisnosti od fizicke kondicije i starosti.

Tokom oporavka treba obezbediti kuju da ne moze da padne s visine i povredi se, ili legne preko kucica i povredi ih.

Kucici se ne smeju ostaviti nasamo s kujom, sve dok ona nije potpuno budna i koordinisana.

Majka treba da se zainteresuje za jelo u nekoliko sati od potpunog budjenja. Prvih 48h nakon operacije treba joj ponuditi male kolicine hrane i tecnosti na kratko, i paziti da se ne prejede, jer to moze dovesti do povracanja. Do 3. ili 4.nedelje sisanja unos hrane moze biti 2 do 2 i po puta veci od normalnog. Najveci unos hrane treba da je u periodu najvece proizvodnje mleka, sto je od prilike, 3 nedelje od stenjenja.

Temperatura majke moze porasti za 0,5 do 1 C iznad normale u prvih 1 do 3 dana po stenjenju i vraca se u normalu (37,8 do 39 C) Veterinar daje antibiotik po operaciji. Ne treba da dajete nikakve dodatne lekove. Ako ste zabrinuti za stanje majke, ne oklevajte nego kontaktirajte svog veterinara.

Kada kucici krecu da sisaju?

Kuju treba podstaci da hrani kucice sto pre po operaciji. Majka mozda nece biti dovoljno budna da sama izdrzi sisanje, pa postoji mogucnost da ce biti potrebna vasa asistencija da je pridrzite da bude mirna dok kucici sisaju.

Ako majka nema mleka, moracete prihranjivati stence 1 do 2 dana, 3-5 hranjenja dnevno, specificnom zamenom za kujino mleko. Iako je pozeljno da stenci odmah sisaju, zdravo novorodjeno stene moze preziveti i do 12h bez sisanja. Ako je stene slabo, dehidrirano ili hladno, sisanje se mora omoguciti sto je pre moguce.

Koliko mora biti topla prostorija gde su stenci?

Novorodjeno stene nije u mogucnosti da regulise telesnu temperaturu kako treba. Sve dok stenci ostaju uz majku, temperatura prostorije nije toliko bitna. Ako nisu s majkom, temperatura prostorije treba da je izmedju 29,5 i 32,2 C. Ako se koristi lampa ili drugo dodatno grejanje, veoma je vazno da ne dodje do pregrevanja.

Da li je krvavi vaginalni iscedak normalan?

Normalan je 3-14 dana po stenjenju. Ako traje duze od par dana, ili je obilan, konsultujte svog veterinara.

Beograd, 3.4.2023.

M.P.

Veterinar