



INSTRUKCIJE FLASTER Durogesic

PODACI O VLASNIKU		25731
Ime i prezime	Popović Tihomir	
Adresa	Kralja Petra I 10 Čačak	
Kontakt telefon	064/6804-119 033/32-54-22	

PODACI O PACIJENTU		Karton 37673		
Ime životinje	a Šaša	Pol	M	Starost 4 god. i 2 m.
Vrsta	Pas	Rasa	Mešanac	
Mikročip	68804578945613	Pasoš	456123	Težina

Poštovani,

S namenom da Vašem ljubimcu omogućimo što kvalitetniji život bez bola odlučili smo se da mu postavimo transdermalni flaster **Durogesic** koji u sebi poseduje veoma snažan analgetik fentanil. Flaster omogućava analgeziju 3 dana kod pasa i 6 dana kod mačaka. Ako pacijent mora da koristi dugotrajno analgetike flaster se jednostavno zameni sa novim nakon 3 dana kod pasa i 6 dana kod mačaka od momenta lepljenja prethodnog flastera.

Većina pacijenata odlično podnosi ovakav vid terapije bola bez većih neželjenih efekata. Najopasniji neželjeni efekat je progresivni prestanak disanja (životinja polako usporava disanje, sve do momenta potpunog prestanka disanja). Do ovog neželjenog momenta može doći ako je na životinju zalepljen flaster veće doze nego što je predviđeno za njenu telesnu težinu tj. usled predoziranja, zato flastere isključivo mora stavljati doktor veterinarske medicine. Do predoziranja takođe može lako doći ako životinja proguta flaster, iz tog razloga preporučujemo nošenje zaštitne kragne ili previjanje flastera posebnim zavojima, kako životinja ne bi grizla ili lizala flaster. Ako ipak dođe do toga da životinja liže ili proguta flaster molimo Vas da odmah odete do prvog veterinara koji će životinji dati odgovarajući lek (**Nalokson**) koji će poništiti dejstvo flastera i spričiti prestanak disanja.

Takođe, morate voditi računa da flaster ne dođe u kontakt sa kožom odraslih ljudi, a naročito dece. Ako odrasli ljudi ili deca greškom zalepe flaster, takođe može doći do prestanka disanja. Tada je neophodno odmah skinuti flaster sa kože, saviti ga kao knjigu, zlepiti unutrašnje strane flastera jednu za drugu. Zatim hitno potražite medicinsku pomoć i objasnite lekaru da ste na koži imali ili došli u kontakt sa flasterom koji u sebi sadrži fentanil (**Durogesic**) a na flasteru je napisana doza analgetika koja se oslobođa u jednom času **12, 25, 50 ili 100 µg/h**. Takođe lekaru pokažite ovo upustvo.

Flaster po prestanku delovanja po pravilu skida doktor veterinarske medicine, ali ako to radite sami, odlepite ga sa kože, presavite ga tako da se stranice zalepe jedna za drugu, umotajte u papir i odnesite kod najbližeg veterinara kako bi bio neškodljivo uklonjen.

Ako se pridržavate ove preporuke i ako doktor veterinarske medicine pravilno postavi flaster na Vašeg ljubimca neželjenih efekata gotovo da nema, a Vašem ljubimcu će biti omogućen kvalitetniji život.

Vašem ljubimcu želimo prijatan život bez bola, Vama što je više moguće lepih sati provedenih sa Vašim ljubimcem.

Flaster ukloniti: _____

Beograd, 12.3.2022.

M.P.

Doktor veterinarske medicine