



## POSTOPERATIVNA NEGA

PODACI O VLASNIKU		25731
Ime i prezime	Popović Tihomir	
Adresa	Kralja Petra I 10 Čačak	
Kontakt telefon	064/6804-119 033/32-54-22	

PODACI O PACIJENTU					Karton 37673
Ime životinje	a Šaša	Pol	M	Starost	4 god. i 2 m.
Vrsta	Pas	Rasa	Mešanac		
Mikročip	68804578945613	Pasoš	456123	Težina	

**Anestezija:** Oporavak iz anestezije je postepen. Pospanost, nekoordinisano kretanje - teturanje, oglašavanje i drhtanje se mogu javiti i do 24h nakon anestezije. Ovakvo ponašanje ljubimca je uobičajeno nakon anestezije i ne bi trebalo da Vas uplaši. Po dolasku kući treba obezbediti Vašem ljubimcu mirno, toplo, i komforno mesto (ne na krevet s kojeg može da padne!!!).

U toku inhalacione anestezije, ljubimcu je u dušnik postavljen tubus, pomoću kojeg udiše mešavinu kiseonika i anestetika. Usled ovoga moguće je da nakon operacije Vaš ljubimac ima blagu iritaciju dušnika, što ga može terati da kašlje ili čak i povrati. Ove pojave su očekivane i ne traju dugo.

**Opštra nega:** Zona operacionog polja je obrijana. Neophodno je da redovno proveravate ranu. Ukolikorana kojim slučajem krvavi ili otiče **odmah kontaktirajte veterinara.**

Vaš ljubimac treba da nosi Elizabetansku (Viktorijansku) kragnu kako bi se sprečilo češanje, lizanje rane i kidanje konaca. Dužina kragne posmatrano sa strane mora biti neznatno duža od dužine njuške. Ukoliko je kragna manja, postoji opasnost da ljubimac dohvati ranu što može dovesti do značajnih ozleđa i komplikacija operacije. Većina ljubimaca se navikne na kragnu tokom par dana. Nošenje kragne je privremena i neophodna mera kojom se obezbeđuje brz i ispravan proces zaceljivanja.

Svaki bandaž ili zavoj koji je postavljen na Vašeg ljubimca mora redovno da se kontroliše. Zavoji i bandaži moraju da budu čisti i suvi.

**Neophodno je odmah kontaktirati veterinara** ukoliko primetite da je ljubimac dirao ili oštetiio bandažu, ukoliko je bandaža vlažna, ukoliko bandaž klizi ili spada, ako je područje oko bandaža otečeno, ukoliko se iz bandaže širi neprijatan miris ili je ljubimac uznemiren.

**Lekovi koji smanjuju bol - analgetici:** Pre i posle operacije ljubimac dobija kombinaciju lekova koji ublažavaju bol što je najčešće dovoljno za postoperativni tok. Kod obimnih operacija, može da bude neophodna dodatna terapija. Lekovi za ljude koji postoje u apotekama najčešće nisu pogodni za životinje i ne mogu da se kombinuju sa eventualnom postojećom terapijom. **Ne radite ništa na svoju ruku. Tražite savet svog veterinara!**

**Postoperativna ishrana:** Nakon 4 sata po izlasku iz anestezije, ljubimcu se može ponuditi manja količina vode, a par sati kasnije i manji obrok ( trećina uobičajenog obroka). U tom slučaju preporučujemo da ponudite manje količine lako svarljive hrane. **I vodu i hranu treba da dajete po sistemu češće a manje.** (4- 5 zalogaja na svakih sat vremena). Postoje komercijalne dijetete koje možemo da Vam preporučimo; ali kao alternativa može da posluži i kuvano pileće belo meso s pirinčem. Ukoliko je neophodno da Vaš ljubimac dobija specifičnu rekovalescentnu dijetu bićete o tome obavešteni.

Molimo Vas da nas kontaktirate ukoliko ste zabrinuti iz bilo kog razloga.

Beograd, 12.3.2022.

Veterinar

M.P.